

Bulletin technique des Chambres d'Agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin



CHAMBRE D'AGRICULTURE

N° 19 du 20 juillet 2010 - 1 page



GRANDES CULTURES

MAÏS

La grande majorité des maïs est en pleine floraison et a même plutôt dépassé ce stade.

Pyrale

Dans tous les secteurs, le pic de vol est maintenant bien dépassé. Les émergences des adultes sont en baisse. La ponte se poursuit, mais à un rythme plus lent que la semaine dernière, confirmant la fin de l'activité des adultes. L'essentiel des pontes est maintenant éclos.

Préconisations

période optimale de positionnement des traitements contre la pyrale se termine dans les secteurs précoces. Dans les autres zones, cette période prendra fin dans les prochains jours. Si vous envisagiez un traitement, il est donc urgent de le réaliser.

MAÏS

- Pyrale
- Helminthosporiose

Helminthosporiose

Sur plus de 80 situations observées, la maladie est signalée dans 8 cas, essentiellement dans la Hardt, mais également dans le Sundgau (1 cas) et en Plaine (1 cas). Dans le Bas-Rhin, la maladie n'a été observée dans aucune des parcelles du réseau. Néanmoins, une tache a été signalée à Rountzenheim sur une parcelle hors du réseau.

La fréquence de pieds touchés est encore faible et ne dépasse jamais 10 %.

Préconisations

La vigilance est donc de mise, particulièrement dans les secteurs les plus à risque (bande rhénane, Hardt, Sundgau...). Les premières taches s'observent en général dans les fourrières, en bordure de parcelle, dans les passages d'irrigation et bien sûr à proximité des sources de contaminations comme les cribs.

CULTURES

Chambre d'Agriculture Région Alsace - 2 rue de Rome - BP 30 022 Schiltigheim - 67013 STRASBOURG CEDEX Directeur de publication : J.P. BASTIAN - ISSN : 2101-5406 - © Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.